Identificación de especies CIP

Julio de 2023

SECatchShares.Fisheries.NOAA.gov

Southeast Regional Office
263 13th Avenue South St.
Petersburg, FL 33701
Asistencia al cliente de Catch Share: 866-425-7627 (opción 2)
correo electrónico: nmfs.ser.catchshare@noaa.gov

Aviso legal: Las revisiones realizadas a este documento se publicarán de forma periódica en la página de internet de CIP de la Oficina Regional del Sureste (Southeast Regional Office IFQ).

Identificación de especies CIP

El propósito de esta guía es ayudar a los pescadores y concesionarios a identificar correctamente las especies administradas por la Cuota Individual de Pesca (CIP) en el Golfo de México. La información obtenida a partir de las descargas de pesca de CIP se utiliza con frecuencia en las determinaciones de existencias; es vital que las especies se identifiquen con precisión y se informen al programa CIP. Algunas especies tienen un aspecto muy similar y pueden confundirse durante la captura o la descarga después de un viaje. A continuación, algunos ejemplos comunes:

1. Abadejo y chema negrillo
2. Chema negrillo y mero pinto
3. Abadejo garropa y chema boca amarilla
4. Conejo amarillo y blanquillo ojo amarillo
5. Blanquillo lucio y blanquillo ojo amarillo

Esta guía tiene como objetivo ayudar en la identificación correcta y a rendir informes sobre las especies en cada transacción de descarga, ya que dicha información contribuye de forma importante a la administración de la pesca.

Todas las fotos y la información de identificación son cortesía del Programa de Observadores de Peces del Arrecife de Galveston del Centro de Ciencias de la Pesca del Sureste

Chema negrillo y abadejo

Tiene puntos color naranja que forman manchas rectangulares con bordes casi cuadrados.
El chema negrillo también suele tener un cuerpo más grande (altura) que el abadejo.

El abadejo tiene “marcas de besos” que van desapareciendo con la edad.
Le falta el borde ancho y negro que se encuentra en el chema negrillo.

Chema negrillo y mero pinto



Ambos tienen puntos color naranja que forman manchas, pero en el caso del chema negrillo tienden a ser rectangulares, en comparación con las manchas más redondeadas del mero pinto.

De color variable (dos fases primarias), pero suele tener una tonalidad rojiza en la región dorsal

Abadejo garropa y chema boca amarilla

Conejo amarillo y blanquillo ojo amarillo

Blanquillo lucio y blanquillo ojo amarillo



Pargo rojo y pargo colorado



Pargo rojo y pargo cebado



El pargo cebado usualmente tiene una línea azul debajo del ojo y la coloración de su cuerpo es más aceitunada que el pargo rojo

Pargo rojo

también llamado pargo del norte o pargo rojo auténtico

Lutjanus campechanus



Los ejemplares jóvenes tienen una mancha dorsal difusa



Mero rojo

Epinephelus morio



Abadejo

también conocido como chema negrillo, vientre cobrizo

Mycteroperca microlepis

“Marcas de beso” o patrón de gusano que se reduce con la edad

Preopérculo con espolón dentado



Coloración pálida a gris oscuro

Chema negrillo

también conocido como carbuerita, carbo

Mycteroperca bonaci

Mero pinto

también conocido como guacamayo

Mycteroperca venenosa



Borde amarillo en las aletas pectorales

Muy parecido al chema negrillo. Usualmente, la parte superior de su cuerpo es rojo brillante

Abadejo garropa

Mycteroperca phenax

Aleta caudal en forma de “escoba”

Abundantes puntos rojizos y marrón

Preopérculo nudoso

Nota: Tiene la boca amarilla



Los ejemplares jóvenes carecen de cola en forma de escoba

Cherna boca amarilla

Mycteroperca interstitialis

Patrón rectangular

Sin cola en forma de escoba



Aleta anal redondeada

Mero lenteja

también conocido como Kitty Mitchell, mero de Calico, fresa

Epinephelus drummondhayi



Los ejemplares jóvenes tienen puntos blancos sobre un fondo amarillo

Mero negro

Epinephelus nigritus

El mero negro joven (10 espinas) se puede confundir con el mero nevado (11 espinas). En caso de dudas, cuente las espinas dorsales.

Mero nevado

también conocido como brownie

Epinephelus niveatus

Mero de aleta amarilla

Epinephelus flavolimbatus

Conejo amarillo

Lopholatilus chamaeleonticeps



Blanquillo lucio

También conocido como blanquillo gris

Caulolatilus microps

Sin coloración oscura en la base de la aleta pectoral

Línea azul abajo del ojo



Nota: El blanquillo ojo amarillo y el domingo tienen una coloración oscura en la base de la aleta pectoral

Blanquillo ojo amarillo

Caulolatilus chrysops

Especies similares no aparecen en la guía. Domingo:
El domingo y el blanquillo ojo amarillo tienen un punto oscuro en la axila pectoral, pero el domingo tiene una línea distintiva debajo de la aleta dorsal